



## 双氯芬酸二乙胺乳胶剂说明书

扶他林®

**请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。**

### [药品名称]

通用名称：双氯芬酸二乙胺乳胶剂

商品名称：扶他林®

英文名称：Diclofenac Diethylamine Emulgel

汉语拼音：Shuanglüfensuan Eryi'an Rujiaoji

### [成份]

本品每支含双氯芬酸二乙胺 0.2 克（以双氯芬酸钠计）。辅料为异丙醇和丙二醇等。

### [性状]

本品为白色或淡黄色乳脂样凝胶，味香。

### [作用类别]

本品为镇痛类非处方药药品。

### [适应症]

用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如：缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。

### [规格]

20 克：0.2 克（以双氯芬酸钠计）。

### [用法用量]

外用。按照患处面积大小，使用本品适量，轻轻揉搓，使本品渗透皮肤，一日 3-4 次。



按患处面积大小确定使用剂量。通常  
每次使用本品约3-5厘米或更多。



轻轻揉搓



药物成份渗透皮肤，直达患处。

### [不良反应]

1. 可出现局部不良反应，通常为轻度、一过性的：常见不良反应包括过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、刺痛、水肿、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。
2. 如果发生以下罕见或非常罕见但严重的不良反应，应立即停用本品，并咨询医师：水疱样皮疹、荨麻疹；哮喘发作、气短、胸闷；面部、口唇、舌及咽喉水肿等血管神经性水肿的表现。
3. 非常罕见的光敏反应，可表现为皮肤晒伤伴瘙痒、肿胀和水疱。如发生这种情况，请咨询医师。

### [禁忌]

1. 对其他非甾体抗炎药过敏者禁用。

2. 对异丙醇或丙二醇及其他辅料过敏者禁用。
3. 妊娠期妇女禁用。

#### [注意事项]

1. 由于局部应用也可全身吸收，故应严格按照说明书规定剂量使用，避免长期大面积使用。
2. 12岁以下儿童不推荐使用。
3. 肝、肾功能不全者使用前请咨询医师或药师。
4. 如果有怀孕的计划，在使用本品前，请咨询医师。不推荐哺乳期妇女使用本品。
5. 不得用于破损皮肤、有皮疹或湿疹的皮肤、以及感染性创口。
6. 用药后，请清洗双手。避免接触眼睛和其他黏膜（如口、鼻等）。如果本品不慎进入眼睛，请用清水充分清洗。如仍有不适，请咨询医师。
7. 治疗肌肉、关节损伤，请勿使用本品超过2周；治疗关节炎疼痛，请勿使用本品超过3周。如需更长时间的治疗，请咨询医师。
8. 如使用本品7日，局部疼痛或肿胀未缓解，请咨询医师或药师。
9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10. 本品性状发生改变时禁止使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 儿童必须在成人监护下使用。
13. 本品中含有丙二醇，可能引起某些人局部皮肤的轻度刺激。
14. 如正在使用或近期曾使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。
15. 若意外吞食本品可能出现同口服非甾体抗炎药类似的不良反应症状，应立即（呕）吐出本品，并在短时间内就医。
16. 使用本品后，如果发生皮疹，应停止使用。
17. 如使用过多本品，用纸巾擦去多余的乳胶剂。
18. 如忘记按时使用本品，在想起来时立刻用药，之后按平时的时间表用药，不要使用双倍的用量补偿上次遗忘的用药。
19. 可以使用扭伤等损伤时常规使用的支撑或封包，但不要使用密闭的塑料绷带。

#### [药物相互作用]

如与其他药物同时使用可能发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

#### **[药理作用]**

本品为前列腺素合成抑制剂，具有抗炎、镇痛作用。局部应用。其有效成份可穿透皮肤达到炎症区域，缓解急、慢性炎症反应，使炎性肿胀减轻、疼痛缓解。

#### **[贮藏]**

密封，30℃以下保存。

#### **[包装]**

铝管包装。20 克/支，1 支/盒；20 克/支，2 支/盒。

#### **[有效期]**

36 个月。

#### **[执行标准]**

国家食品药品监督管理局标准 YBH07402009

#### **[批准文号]**

国药准字 H19990291

#### **[说明书修订日期]**

2016 年 07 月 28 日

#### **[生产企业]**

企业名称：北京诺华制药有限公司

生产地址：北京市昌平区永安路 31 号

邮政编码：102200

电话号码：4009911165

邮箱：cn.customer-relations@gsk.com

如有问题可与生产企业联系